

مدیریت دراز مدت فشارخون بالا

پیمانه
شطرنج
موزه


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی

- مصرف درست داروها: دارو باید طبق دستور و در ساعت‌های تعیین شده مصرف شود. اگر عوارض دارو آزار دهنده است یا دارو گران است، بیش از هر تصمیمی و انجام هر کاری باید با پژوهش مشورت نمود. هرگونه اقدام خودسرانه برای تغییر دارو یا روش استفاده آن می‌تواند خطوهای زیادی به دنبال داشته باشد.

- ویژیت مرتب پژوهش: در درمان بیماری فشارخون، دو نفر میهم ترین نقش را دارند اولی بیمار و دوم پژوهش این بیمار. بنابراین وقتی درمان فشارخون به درستی انجام خواهد شد که این دو نفر نهایت همکاری را برای درمان داشته باشند.

- کاهش مصرف نمک: افزایش در مصرف نمک یکی از مهم‌ترین عوامل خطرساز در ابتلاء به فشار خون بالا است.

پوش سلیمان



- قرک مصرف الکل: حتی در افرادی که فشارخون بالا ندارند، خوردن الکل می‌تواند سبب افزایش فشارخون شود. پس لازم است که افراد با فشارخون بالا از نوشیدن الکل برهیز کنند.

- کاهش استرس: برای کاهش استرس باید از روش‌های مختلفی استفاده کرد کار نکردن بیشتر از اندازه عادی، داشتن خواب کافی، تنفس آرام و عمیق، پرهیز از اضطراب، کار گذاشتن افکار منفی و مزاحم، گسترش روابط دوستانه با دیگران، صوری و خوش بین بودن. این کارها تأثیر چشمگیری بر کنترل فشارخون دارد. اگر با این کارها نتوان استرس را کاهش داد، باید برای کمک گرفتن از یک روانشناس یا روانپژوه کمک گرفت.

- اندازه‌گیری فشارخون در خانه: این کار باید طبق یک روال ثابت انجام بگیرد. اندازه‌گیری فشارخون در خانه، این حسن را دارد که فشار اندازه‌گیری شده به اندازه واقعی بسیار نزدیک است و تحت استرس و خستگی افزایش نیافرته است. بهتر است دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار خونی که به دور مچ یا انکش بسته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرند. صحیحی در هر ملاقات با کارکنان بهداشتی و پژوهشی از آنها در خواست کنید فشار خون شما را اندازه‌گیری کنند. در اندازه‌گیری فشار خون باید به باد داشت که باید از تیم سامت قبل از مصرف غذا و نوشیدنی خالی به ویژه قبود و جای خودداری کرد، فعالیت بدنی نداشت. حالی بودن منته، مصرف نکردن سیگار و قرار نداشتن تحت فشارهای عصبی کمک می‌کند که اندازه‌گیری فشارخون دقیق تر نجات شود. اندازه‌گیری مرتب و درست فشارخون به بیمار و پژوهش کمک می‌کند تا به میزان افزایشی دارو و عوارض احتمالی بیماری آگاهی پیدا کند.

پرفشاری خون

بیماری فشارخون بالا بی سروصدای پیشرفته می کند و عوارض خود را ایجاد می کند. مشکلاتی که به دنبال این بیماری بوجود می آید، متنوع است و مهم ترین آن ها عبارتند از سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، آنوریسم (اتساع عروقی) و تخرب شبکیه چشم.




فشارخون طبیعی چیست؟

برای این که خون در سرخرگ ها جریان پیدا کند و موادغذایی را به اعضای مختلف بدن برساند، نیاز به نیروی دارد که خون را به گردش درآورد. این نیرو، فشار خون نامیده می شود. انقباض و انبساط عضلات قلب و سرخرگ ها این نیرو را ایجاد می کند. فشارخون یعنی فشاری که از طرف خون به دیواره داخلی رگ های بدن وارد می شود. اگر دیواره سرخرگ ها به دلیل رسوب چربی توانایی انقباض و انبساط خود را از دست بدند، فشارخون افزایش می یابد. وقتی می گوییم کسی فشارخون بالا دارد یا به بیماری فشارخون بالا مبتلاست، منظور این است که شخص مزبور دچار افزایش فشارخون سرخرگی شده است. در این وضعیت، قلب نیز باید باشد و قدرت بیشتری فعالیت کند. از نظر علمی عبارت «پرفشاری خون» یا «فشار خون بالا» مناسب تر از «فشار خون» است. به دلیل اینکه همه انسان ها باید فشارخون عادی را داشته باشند تا خون بتواند در رگ ها گردش عادی خود را انجام دهد.


مدیریت دراز مدت فشارخون بالا

فشارخون بالا از بیماری هایی نیست که بتوان آن را درمان قطعی کرد و پس از پایان درمان، زندگی را مانند گذشته ادامه داد. این بیماری تا آخر عمر نیاز به مراقبت و توجه دارد. مصرف دارو تنها بخشی از درمان بیماری فشارخون است. در کنار درمان دارویی، افراد مبتلا به بیماری فشار خون بالا باید روش زندگی خود را تغییر بدهند. برای کنترل فشار خون باید به این توصیه ها توجه داشت:



دونکته مهم:

- بعد از ۵۰ سالگی، موارد افزایش فشار سیستولیک بیشتر دیده می شود. چون در این سنین، رایج ترین نوع بیماری فشارخون، همان نوعی است که در آن، فشار خون سیستولیک افزایش پیدا می کند، اما فشار دیاستولیک طبیعی باقی می ماند.
- در افرادی که فشارخون در محدوده آستانه است، تقریباً یک نفر از هر سه نفر در سنین ۴۶-۳۵ سالگی و یک نفر از هر دو نفر در سن بالای ۶۵ سالگی به فشار خون دچار می شوند.



● **تغییر الگوی تغذیه ای و تغذیه سالم:** باید به یک برنامه غذایی هدف دار و مخصوص بیماران فشارخونی روی آورد. کاهش مصرف چربی، مصرف روغن مایع به جای روغن جامد، افزایش مصرف انواع سبزی ها و میوه ها، حبوبات و موادغذایی سبوس دار و لبندیات کم چرب کاهش مصرف نمک و غذاهای شور و افزایش مصرف پتاویسیم، پخت غذا به روش های صحیح مانند بخاریز یا آب پز و پرهیز از سرخ کردن غذاها نمونه هایی از اصول تغذیه سالم است.

● **رسیدن به وزن ایده آل:** در صورت وجود اضافه وزن، باید کاهش وزن و رسیدن به وزن طبیعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش وزن حتی به اندازه ۲ کیلوگرم، اثر فوق العاده ای بر کاهش فشارخون خواهد داشت. برخی بررسی ها نشان داده است که کاهش یک کیلوگرم وزن اضافه، فشارخون را یک میلیمتر جیوه کاهش می دهد.

● **افزایش فعالیت بدنی:** انجام ورزش روزانه و منظم برای مبارزه با کم تحرکی برای رسیدن به وزن مناسب کمک کننده است. انجام حداقل نیم ساعت فعالیت بدنی با شدت متوسط در حداقل ۵ روز در هفته را می توان به عنوان یک الگوی مناسب در نظر گرفت.

● **ترک مصرف دخانیات:** تباکو سبب می شود که سرعت ساخته شدن پلاک در دیواره سرخرگ ها افزایش پیدا کند و بیمار فشارخونی با عوارض قلبی عروقی بیماری روبرو شود. اگر کنار گذاشتن دخانیات برای فرد دشوار است، باید از پیشک برای حل این مشکل کمک بگیرد.